

UZORAK I POPULACIJA

IST P6

1/41

UZORAK I POPULACIJA

POPULACIJA

- osnovni skup
- skup svih jedinica promatranja (entiteta) opisanih varijablama (atributima)

UZORAK - dio jedinica populacije (osnovnog skupa)

TEORIJA UZORAKA

- ustanovljava svojstva populacije iz svojstava uzorka
- procjenjuje parametre populacije na temelju parametara uzorka i ocjenjuje pouzdanost te procjene

IST P6

2/41

UZORAK I POPULACIJA

UOBIČAJENE OZNAKE

	OCJENA PARAMETRA (STATISTIKA)	PARAMETAR POPULACIJE
ARITMETIČKA SREDINA	\bar{X}	μ
STANDARDNA DEVIJACIJA	s	σ
PROPORCIJA	p	π

IST P6

3/41

OSNOVNI POJMOVI

Koja je skupina na koju želimo generalizirati?

TEORETSKA POPULACIJA

Koja je populacija dostupna?

POPULACIJA KOJU ISTRAŽUJEMO

Na koji način možemo obuhvatiti populaciju?

OKVIR IZBORA

Tko je uključen u istraživanje?

UZORAK



IST P6

4/41

UZORAK I POPULACIJA

Kvaliteta ocjene parametara ovisi o:

- REPREZENTATIVNOSTI UZORKA
- ODABRANOJ VJEROJATNOSTI

IST P6

5/41

REPREZENTATIVNI UZORAK

- uzorak koji dobro opisuje populaciju

Na reprezentativnost uzorka utječu:

1. Vrsta uzorka (prema metodi odabira)
2. Veličina uzorka
3. Varijabilnost promatranog obilježja

IST P6

6/41

VRSTE UZORAKA

PROBABILISTIČKI (probability samples)

- svaka jedinica promatranja u populaciji ima jednaku vjerojatnost izbora u uzorak koja je različita od 0

NEPROBABILISTIČKI (non-probability samples)

- vjerojatnost izbora jedinica promatranja iz populacije je različita i nepoznata (može biti i 0)

IST P6

7/41

PROBABILISTIČKI UZORCI

JEDNOSTAVNI SLUČAJNI
SUSTAVNI SLUČAJNI
SLOJEVITI (STRATIFICIRANI)
UZORAK SKUPINE
VIŠEFAZNI

IST P6

8/41

JEDNOSTAVNI SLUČAJNI UZORAK (simple random sample)

svojstva:

- *svaki element* populacije ima *jednaku šansu* da bude izabran
- *svaki uzorak* ima *jednaku šansu* da bude izabran

način izbora:

- lutrijska metoda
- pomoću tablice slučajnih brojeva
- pomoću programske podrške koja ima funkciju generatora slučajnih brojeva

IST P6

9/41

SUSTAVNI SLUČAJNI UZORAK (systematic sample)

- jedinice koje ulaze u uzorak odabiru se po nekakvom pravilu

postupak:

- numerirati jedinice populacije od 1 do N
- odrediti potrebnu veličinu uzorka (n)
- odrediti veličinu intervala $k=N/n$
- slučajno odabrati broj između 1 i k (početna jedinica)
- uzimati svaku k-tu jedinicu

IST P6

10/41

SLOJEVITI (STRATIFICIRANI) UZORAK

- primjenjuje se u slučajevima kad je promatrano obilježje heterogeno u populaciji
- dobiva se uzimanjem jednostavnih slučajnih uzoraka iz stratuma određenih obzirom na promatrano obilježje

postupak:

- podijeliti populaciju na disjunktne skupine od n_1, n_2, \dots, n_s jedinica, pri čemu je $n_1+n_2+\dots+n_s = N$
- uzeti jednostavni slučajni uzorak od $f_i = n_i/N$ jedinica iz svake skupine

IST P6

11/41

UZORAK SKUPINE (CLUSTER)

- primjenjuje se u slučajevima kada treba uzeti uzorak iz populacije koja se sastoji od skupina jedinica (ulice, popisni krugovi, škole, općine, ...)

postupak:

- podijeliti populaciju na skupine jedinica
- jednostavnim slučajnim izborom odabrati skupine
- ispitati SVE jedinice unutar odabranih skupina

IST P6

12/41

VIŠEFAZNI UZORAK

- uzimanje "uzorka iz uzorka"
- kombinacija više metoda odabiranja uzorka

Npr. jedan od mogućih načina dobivanja uzorka iz populacije učenika osnovnih škola u Hrvatskoj:

- podijeliti osnovne škole u stratumе s obzirom na županijsku pripadnost
- iz svakog stratuma jednostavnim slučajnim izborom odabrati škole (prva faza)
- unutar odabranih škola, jednostavnim slučajnim izborom odabrati razrede (druga faza)
- unutar odabranih razreda, jednostavnim slučajnim izborom odabrati učenike (treća faza)

IST P6

13/41

NEPROBABILISTIČKI UZORCI

PRIGODNI (convenience)
UZORAK KOJI SLUŽI SVRSI (purposive)
UZORAK UDJELA (quota)

IST P6

14/41

PRIGODNI UZORAK (convenient sample)

- u uzorak se biraju jedinice populacije koje su "pri ruci" (npr. prolaznici, pozvani dobrovoljci, prvih 50 pacijenata u nekoj ambulanti)

UZORAK KOJI SLUŽI SVRSI (purposive sample)

- u uzorak se biraju jedinice populacije koje imaju traženo svojstvo

UZORAK UDJELA (quota sample)

- u uzorak se bira određeni broj jedinica odabranih dijelova populacije

IST P6

15/41

U kojem od sljedećeg se koristi jednostavni slučajni uzorak:

- igra "Bingo",
- popis stanovništva,
- izbori za lokalnu samoupravu?

Koje metode odabira uzorka se koriste u ovim primjerima?

IST P6

16/41

- igra "Bingo" - jednostavni slučajni uzorak
- popis stanovništva - ne koristi jednostavni slučajni uzorak jer SVE jedinice populacije moraju biti obuhvaćene popisom
- izbori za lokalnu samoupravu - neprobabilistički uzorak; na izbore izlaze oni koji to žele ("dobrovoljci")

IST P6

17/41

VELIČINA UZORKA

dovoljno veliki uzorak:

- uzorak pomoću kojeg s razumnom pouzdanošću možemo prihvatiti ili odbaciti neku hipotezu i ocijeniti parametar populacije

ovisit će o:

- homogenosti populacije s obzirom na promatrano obilježje
- učestalosti promatranog obilježja (obrnuto proporcionalno)

IST P6

18/41

UTJECAJ VARIJABILNOSTI

- varijabilnost je često nepoznata
- poznata, a velika varijabilnost ugrožava reprezentativnost uzorka
- utjecaj varijabilnosti se smanjuje s povećanjem uzorka

IST P6

19/41

STANDARDNA POGREŠKA

IST P6


20/41

POKUS 1. Napraviti razdiobe aritmetičkih sredina 500 uzoraka veličine $n=4$, $n=20$ i $n=50$ osnovnog skupa $N=101$ brojeva od 0 do 100.

aritmetička sredina osnovnog skupa $\mu = 50$
standardna devijacija osnovnog skupa $\sigma = 29.15$

IST P6

21/41



22/41

N veličina osnovnog skupa

n veličina slučajnih uzoraka

$\binom{N}{n}$ broj svih mogućih uzoraka veličine n uzetih iz osnovnog skupa veličine N

- | | | | |
|----------------|---------------------------------|-------------|-------|
| 1. uzorak | $x_{11}, x_{12}, \dots, x_{1n}$ | sa sredinom | x_1 |
| 2. uzorak | $x_{21}, x_{22}, \dots, x_{2n}$ | sa sredinom | x_2 |
| 3. uzorak | $x_{31}, x_{32}, \dots, x_{3n}$ | sa sredinom | x_3 |
| | | | |
| k -ti uzorak | $x_{k1}, x_{k2}, \dots, x_{kn}$ | sa sredinom | x_k |

IST P6

23/41

$\bar{x}_1, \bar{x}_2, \bar{x}_3, \dots, \bar{x}_k$ slučajna varijabla
(sampling distribucija)

OČEKIVANJE $E(\bar{x}) = \mu$

VARIJANCA $V(\bar{x}) = \frac{\sigma^2}{n}$

standardna devijacija $s_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ **STANDARDNA POGREŠKA**
(SE, standard error)

IST P6

24/41

- za slučajne i dovoljno velike uzorke

$$s_{\bar{x}} = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

**STANDARDNA
POGREŠKA
(SE, standard error)**

- standardna pogreška aritmetičke sredine (SEM, *standard error of the mean*)
- pogreška kojoj se izlažemo pri zaključivanju o populaciji na temelju uzorka

$s \uparrow \Rightarrow s_{\bar{x}} \uparrow$ *povećava se s povećanjem varijabilnosti obilježja*
 $n \uparrow \Rightarrow s_{\bar{x}} \downarrow$ *smanjuje se s povećanjem veličine uzorka*

IST P6

25/41

CENTRALNI GRANIČNI TEOREM



Razdioba aritmetičkih sredina uzoraka teži normalnoj razdiobi s očekivanjem μ i varijancom $\sigma_{\bar{x}}^2 [N(\mu, \sigma_{\bar{x}}^2)]$ kad veličina uzorka n teži u beskonačnost.

\Rightarrow *za dovoljno velike uzorke* razdioba aritmetičkih sredina uzoraka bit će **normalna**, bez obzira na razdiobu vrijednosti promatranog obilježja

IST P6

26/41

za proporciju:

$$s_p = \sqrt{\frac{p \cdot q}{n}}$$

**STANDARDNA
POGREŠKA
PROPORCIJE**

$p \uparrow \Rightarrow s_{\bar{x}} \downarrow$ *smanjuje se s povećanjem homogenosti obilježja*
 $n \uparrow \Rightarrow s_{\bar{x}} \downarrow$ *smanjuje se s povećanjem veličine uzorka*

IST P6

27/41

STANDARDNA POGREŠKA

vs

STANDARDNA DEVIJACIJA

STANDARDNA POGREŠKA:

- procjenjuje "kvalitetu" ocjene parametra (statistike)
- velika standardna pogreška \Rightarrow ocjena parametra (ar. sredina, proporcija) je neprecizna

STANDARDNA DEVIJACIJA:

- opisuje varijabilnost podataka
- velika standardna devijacija \Rightarrow velika varijabilnost podataka

IST P6

28/41

RASPON POUZDANOSTI

IST P6

29/41

RASPON POUZDANOSTI

- confidence interval (CI)
- uobičajeno tumačenje: raspon unutar kojega se, s određenom vjerojatnošću, nalazi prava vrijednost (parametar) populacije

RASPON POUZDANOSTI ARITMETIČKE SREDINE

$$\bar{x} - z \cdot s_{\bar{x}} \leq \mu \leq \bar{x} + z \cdot s_{\bar{x}}$$

RASPON POUZDANOSTI PROPORCIJE

$$p - z \cdot s_p \leq \Pi \leq p + z \cdot s_p$$

z - standardizirana vrijednost normalne raspodjele (ovisi o pretpostavljenoj vjerojatnosti)

IST P6

30/41

RASPON POUZDANOSTI

PRIMJER. Koliki je raspon pouzdanosti ako želimo obuhvatiti μ sa:

- a) 99% pouzdanosti
 - b) 95% pouzdanosti
 - c) 90% pouzdanosti
- uz pretpostavku normalne razdiobe?

a) $z_{0,005}=2.756 \approx 2.58$ $\bar{x} - 2.58 \cdot s_{\bar{x}} \leq \mu \leq \bar{x} + 2.58 \cdot s_{\bar{x}}$

b) $z_{0,025}=1.96$ $\bar{x} - 1.96 \cdot s_{\bar{x}} \leq \mu \leq \bar{x} + 1.96 \cdot s_{\bar{x}}$

c) $z_{0,05}=1.65$ $\bar{x} - 1.65 \cdot s_{\bar{x}} \leq \mu \leq \bar{x} + 1.65 \cdot s_{\bar{x}}$

IST P6

32/41

RASPON POUZDANOSTI

PRIMJER. Od 1000 ljudi koji su cijepljeni, 200 ih je pokazalo alergične reakcije. Koliku proporciju alergičnih očekujemo u populaciji cijepljenih uz vjerojatnost od 95%?

$$z_{0,025}=1.96 \qquad p - 1.96 \cdot s_p \leq \Pi \leq p + 1.96 \cdot s_p$$

$$p=0.20; \quad q=0.80;$$

$$s_p = \sqrt{\frac{0.2 \cdot 0.8}{1000}} = \sqrt{\frac{0.16}{1000}} = \sqrt{0.00016} = 0.0126$$

$$0.2 - 1.96 \cdot 0.0126 \leq \Pi \leq 0.2 + 1.96 \cdot 0.0126$$

$$0.2 - 0.025 \leq \Pi \leq 0.2 + 0.025$$

$$0.175 \leq \Pi \leq 0.225$$

IST P6

32/41

95% raspon pouzdanosti aritmetičke sredine izračunat iz nekog uzorka:

- **uobičajeno** se tumači kao raspon vrijednosti unutar kojeg se s 95% pouzdanosti nalazi prava vrijednost aritmetičke sredine (aritmetička sredina populacije)
- **u stvari znači** da očekujemo da 95% takvih intervala dobivenih iz uzoraka iste veličine dane populacije uključuje pravu vrijednost aritmetičke sredine

IST P6

33/41


95% raspon pouzdanosti:

Slučajan interval čije granice se mogu izračunati iz podataka o uzorku, takav da 95 od svakih 100 takvih intervala obuhvaća pravu vrijednost parametra koji se procjenjuje.

- također i raspon poželjnih vrijednosti parametra populacije (prihvatljiva nul-hipoteza)

IST P6

34/41




IST P6

35/41


Širina raspona pouzdanosti ovisi o:

- pretpostavljenoj vjerojatnosti
- varijabilnosti promatranog obilježja
- veličini uzorka

širi se s povećanjem pouzdanosti



sužava se s povećanjem uzorka



IST P6

36/41

6

POTREBNA VELIČINA UZORKA za procjenu aritmetičke sredine

Ovisit će o:

- pogrešci procjene koju ćemo tolerirati
- stupnju pouzdanosti
- pretpostavljenoj varijabilnosti

$$E = z \cdot s_{\bar{x}} = z \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} \quad \text{POGREŠKA PROCJENE}$$

$$n = \left(\frac{z \cdot s}{E} \right)^2 \quad \text{POTREBNA VELIČINA UZORKA}$$

IST P6

37/41

PRIMJER. Koliko ispitanika treba izabrati u uzorak kako bi se procijenila prosječna starost stanovnika nekog sela u 95% rasponu pouzdanosti od 2 godine? Pretpostavlja se kako je standardna devijacija populacije 8 godina.

Koliki uzorak treba biti ako toleriramo pogrešku od najviše ± 10 mjeseci?

$$z_{0.025}=1.96 \quad E=1 \quad \sigma = 8$$

$$n = \left(\frac{z_{0.025} \cdot 8}{1} \right)^2 = \left(\frac{1.96 \cdot 8}{1} \right)^2 = 15.68^2 = 245.86 \approx 246$$

$$z_{0.025}=1.96 \quad E=10/12=0.83 \quad \sigma = 8$$

$$n = \left(\frac{z_{0.025} \cdot 8}{0.83} \right)^2 = \left(\frac{1.96 \cdot 8}{0.83} \right)^2 = 18.89^2 = 356.83 \approx 357$$

POTREBNA VELIČINA UZORKA za procjenu proporcije

Ovisit će o:

- pogrešci procjene koju ćemo tolerirati
- stupnju pouzdanosti
- pretpostavljenoj proporciji

$$E = z \cdot s_p = z \cdot \sqrt{\frac{p \cdot q}{n}} \quad \text{POGREŠKA PROCJENE}$$

$$n = \left(\frac{z}{E} \right)^2 \cdot p \cdot q \quad \text{POTREBNA VELIČINA UZORKA}$$

IST P6

39/41

PRIMJER. Studija provedena na Fakultetu javnog zdravstva na Harvardu utvrdila je da 19% studenata nikada ne piju alkohol. Koliki uzorak vam je potreban za procjenu proporcije studenata koji ne piju alkohol na vašem fakultetu unutar raspona od 10% uz pouzdanost od 95%, vodeći se rezultatima harvardske studije?

$$z_{0.025}=1.96 \quad E=0.1/2=0.05 \quad p = 0.19$$

$$n = \left(\frac{z}{E} \right)^2 \cdot p \cdot q = \left(\frac{1.96}{0.05} \right)^2 \cdot 0.19 \cdot 0.81 = 39.3^2 \cdot 0.19 \cdot 0.81 = 236.49 \approx 237$$

IST P6

40/41

$p = 0.5$ koristimo kada nemamo prethodnih saznanja o pretpostavljenoj proporciji

$$z_{0.025}=1.96 \quad E=0.1/2=0.05 \quad p = 0.5$$

$$n = \left(\frac{z}{E} \right)^2 \cdot p \cdot q = \left(\frac{1.96}{0.05} \right)^2 \cdot 0.5 \cdot 0.5 = 39.3^2 \cdot 0.25 = 384.15 \approx 385$$

IST P6

41/41